



biblioteca
virtual en salud

Biblioteca Virtual en Ciencias de la Salud. Información
Sanitaria en la red: nuevos recursos, nuevos servicios

Cochrane Library Plus en español

Silvia Hernández Villegas (silviahernandez@isciii.es)

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud

Instituto de Salud Carlos III

4 de Septiembre de 2007



biblioteca
virtual en salud

Índice general

Cochrane

- ✗ ¿Qué es la colaboración Cochrane?
- ✗ La Cochrane Library
- ✗ Cochrane Library Plus en español
- ✗ Modos de acceso
- ✗ Contenidos



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Colaboración Cochrane

La **Colaboración Cochrane** es un organismo internacional no lucrativo, cuyo fin es elaborar revisiones sistemáticas a partir de ensayos clínicos controlados, así como revisiones de la evidencia más fiable derivadas de otras fuentes.

Entre sus objetivos principales se encuentra mantener actualizadas y difundir estas revisiones, a través de la "*Cochrane Library*".



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Cochrane Library

- La **Cochrane Library** presenta el trabajo de la *Cochrane Collaboration* y de otros organismos, también interesados en recopilar datos basados en la evidencia, sobre los efectos en la asistencia sanitaria.
- Esta base de datos es realizada por grupos colaboradores de revisión, a su vez coordinados por un equipo editorial que asegura la calidad científica de los estudios. La *Cochrane Library* se actualiza trimestralmente.



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Cochrane Library Plus

La **Cochrane Library Plus en español** es la primera edición de La Cochrane Library realizada por Update Software en un idioma distinto al inglés.







Esta edición, coordinada por Infoglobal Suport, contiene la traducción al español de **revisiones sistemáticas completas y de otros documentos relevantes a los que se puede acceder a través de una interfaz en español.**



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Cochrane Library Plus-contenido

- ☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (2668 de 2668)
- ☐ Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos (2996 de 2996)
-  Bandolera (317 de 317)
-  Informes de Gestión Clínica y Sanitaria (678 de 678)
-  Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (191 de 191)
-  Kovacs (Revisiones del dolor de espalda) (227 de 227)
-  Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria (36 de 36)
- ☐ The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (477942 de 477942)
- ☐ The Cochrane Methodology Register (CMR) (8408 de 8408)
-  About the Cochrane Collaboration (91 de 91)
- ☐ Other Published Reviews (4113 de 4113)
- ☐ Health Technology Assessment Database (HTA) (6011 de 6011)
- ☐ NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) (18725 de 18725)



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Modos de acceso

✗ Desde la Página del Ministerio de Sanidad y Consumo

<http://www.msc.es>

Desde la BVS-España. Para su consulta desde España

<http://bvs.isciii.es>

✗ Desde la BVS Regional. Para su consulta desde América Latina y el Caribe

<http://www.bvs.br>



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Página de acceso



VÍNCULOS

[Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus](#)

[Los resúmenes de revisiones Cochrane](#)

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

[Registrar un nombre de usuario](#)

[Suscribirse](#)

[¿Qué es un RSS?](#)

[El canal RSS **XML**](#)



Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus

Hacer clic en ACCEDER para iniciar la Biblioteca Cochrane Plus.

[ACCEDER](#)

Hacer clic aquí para acceder mediante nombre de usuario y contraseña

Instrucciones:

Si usted ya posee una suscripción o es miembro de una organización que está suscrita, puede acceder a la Biblioteca Cochrane Plus de forma anónima o mediante un nombre y una contraseña.
En caso de problemas con el acceso, contactar con Infoglobal Suport:
Tel: +34 93 - 726 30 44 / +34 93 - 726 81 36
cochrane@infoglobal-suport.com

El canal RSS **XML**

El RSS puede avisarle cada vez que aparece una nueva revisión Cochrane. Hacer clic aquí para saber más

Edición de la Biblioteca Cochrane Plus:

InfoGlobal Suport



Centro Cochrane Iberoamericano



El Centro Cochrane Iberoamericano está ubicado en

**HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU**
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El acceso universal gratuito a la BCP, en **todo el territorio español**, es posible gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.



Se puede consultar la BCP de forma gratuita en los siguientes países de bajos ingresos: **Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y todos los países caribeños.**

El acceso universal gratuito a la BCP, en **todo el territorio centroamericano**, es posible gracias a la suscripción realizada por la International Health Central American Institute Foundation (IHCAI Foundation).



Los usuarios en el resto de países iberoamericanos (**Argentina, Brasil, Chile, Colombia**



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Página de acceso-vínculos



VÍNCULOS

[Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus](#)

[Los resúmenes de revisiones Cochrane](#)

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

[Registrar un nombre de usuario](#)

[Suscribirse](#)

[¿Qué es un RSS?](#)

[El canal RSS **XML**](#)



Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus

Hacer clic en ACCEDER para iniciar la Biblioteca Cochrane Plus.

[ACCEDER](#)

Hacer clic aquí para acceder mediante nombre de usuario y contraseña

Instrucciones:

Si usted ya posee una suscripción o es miembro de una organización que está suscrita, puede acceder a la Biblioteca Cochrane Plus de forma anónima o mediante un nombre y una contraseña.

En caso de problemas con el acceso, contactar con Infoglobal Suport:
Tel: +34 93 - 726 30 44 / +34 93 - 726 81 36
cochrane@infoglobal-suport.com

El canal RSS **XML**

El RSS puede avisarle cada vez que aparece una nueva revisión Cochrane. Hacer clic aquí para saber más

Edición de la Biblioteca Cochrane Plus:

InfoGlobal Suport


Centro Cochrane Iberoamericano


El Centro Cochrane Iberoamericano está ubicado en
 HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA



MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

El acceso universal gratuito a la BCP, en **todo el territorio español**, es posible gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Se puede consultar la BCP de forma gratuita en los siguientes países de bajos ingresos: **Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y todos los países caribeños.**

El acceso universal gratuito a la BCP, en **todo el territorio centroamericano**, es posible gracias a la suscripción realizada por la International Health Central American Institute Foundation (IHCAI Foundation).



Los usuarios en el resto de países iberoamericanos (**Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Puerto Rico, Uruguay**



biblioteca
virtual en salud

Página de acceso-lista de títulos

Lista alfabética de títulos de Revisiones Cochrane traducidas y publicadas en *La Biblioteca Cochrane Plus* número 3, 2006

A - Z Listing

Novedades en este número

Buscar los resúmenes

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [X] [Y] [Z]

Para ver el resumen de la revisión haga clic en el título.

5-Fluorouracilo postoperatorio para la cirugía de glaucoma

A

Abandono del hábito de fumar para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica
Abandono del hábito de fumar para la prevención secundaria de la cardiopatía coronaria
Ablación ovárica para el cáncer de mama precoz
Ablación retiniana periférica para la retinopatía umbral del prematuro
Ablación térmica por radiofrecuencia versus otras intervenciones para el carcinoma hepatocelular
Abordaje quirúrgico posterior versus lateral para artroplastia total de cadera en adultos con osteoartritis
Abordajes multidisciplinarios coordinados para la rehabilitación de pacientes ancianos hospitalizados con fracturas femorales proximales
Abordajes quirúrgicos de la histerectomía para las enfermedades ginecológicas benignas
Abordajes quirúrgicos para la inserción de una hemiartroplastia de cadera
Abordajes quirúrgicos y técnicas auxiliares para la fijación interna de la fractura femoral intracapsular proximal
Aceite de pescado en personas con diabetes mellitus tipo 2
Aceite de ricino, baños o enemas para la maduración cervical y la inducción del trabajo de parto
Acetaminofeno para la osteoartritis
Acetato de ciproterona para el hirsutismo
Acetato de megestrol para el tratamiento del síndrome de anorexia-caquexia
Acetato de plata para dejar de fumar
Acetato de zuclopentixol para la esquizofrenia aguda y enfermedades mentales graves similares



biblioteca
virtual en salud

Página de acceso-resumen

De La Biblioteca Cochrane Plus, número 3, 2006. Oxford, Update Software Ltd. Todos los derechos están reservados.

ácido valproico, valproato y divalproex en la terapia de mantenimiento del trastorno bipolar (Revisión Cochrane traducida)

Macritchie K.A.N., Geddes J.R., Scott J, Haslam D.R.S., Goodwin G.M.

[Leer el texto completo](#)
[Ver y/o enviar comentarios](#)
[Novedades en este número](#)
[Buscar los resúmenes](#)
[Visualizar lista alfabética de títulos](#)

Fecha de la modificación significativa más reciente: 19 de marzo de 2001. Las revisiones Cochrane se revisan regularmente y se actualizan si es necesario.

RESUMEN EN TÉRMINOS SENCILLOS

Esta revisión investigó la eficacia y la aceptación del valproato comparado contra placebo y contra otros estabilizadores del estado de ánimo en la terapia de mantenimiento del trastorno bipolar. Solamente hubo un ensayo controlado aleatorio que cumplió los criterios de inclusión de la revisión. Dicho ensayo comparó el uso de divalproex contra placebo y contra litio durante un período de doce meses. El ensayo tuvo varios fallos metodológicos que limitan la confiabilidad de sus resultados. Sin embargo, los participantes que tomaron divalproex tenían menos probabilidad de tener una recaída que aquellos asignados al grupo placebo, y no hubo diferencias entre el litio y el divalproex en este sentido. Comparado contra placebo, hubo más pacientes tratados con divalproex que abandonaron el estudio por efectos secundarios, pero un número menor cuando se comparó contra el tratamiento con litio.

RESUMEN

Antecedentes:

Aunque el litio ha sido habitualmente utilizado dentro de la terapia de mantenimiento en el trastorno bipolar durante varias décadas, ha aumentado el uso del valproato para ese propósito - especialmente en los Estados Unidos de América. Es necesario aclarar si se justifica el papel profiláctico, cada vez más prominente, que tiene el valproato en el trastorno bipolar.

Objetivos:

Revisar la efectividad del valproato en comparación con placebo, otros estabilizadores del estado anímico, y antipsicóticos en la prevención y/o atenuación de los episodios agudos del trastorno bipolar. Se consideró la efectividad del valproato en términos de los síntomas del estado anímico, la mortalidad, el estado de salud general, el funcionamiento social, los efectos adversos y el grado de aceptación global por parte de los pacientes.



biblioteca
virtual en salud

Página de acceso-texto completo



[Hacer clic aquí](#) para comprar esta revisión en forma de PDF.

ÁCIDO VALPROICO, VALPROATO Y DIVALPROEX EN LA TERAPIA DE MANTENIMIENTO DEL TRASTORNO BIPOLAR

Macritchie K.A.N., Geddes J.R., Scott J, Haslam D.R.S., Goodwin G.M.

...

Fecha de la modificación significativa más reciente: 19 de marzo de 2001

Esta revisión debería citarse como: Macritchie K.A.N., Geddes J.R., Scott J, Haslam D.R.S., Goodwin G.M. ácido valproico, valproato y divalproex en la terapia de mantenimiento del trastorno bipolar (Revisión Cochrane traducida). En: *La Biblioteca Cochrane Plus*, 2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de *The Cochrane Library*, 2006 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

RESUMEN

Antecedentes

Aunque el litio ha sido habitualmente utilizado dentro de la terapia de mantenimiento en el trastorno bipolar durante varias décadas, ha aumentado el uso del valproato para ese propósito - especialmente en los Estados Unidos de América. Es necesario aclarar si se justifica el papel profiláctico, cada vez más prominente, que tiene el valproato en el trastorno bipolar.

Objetivos

Revisar la efectividad del valproato en comparación con placebo, otros estabilizadores del estado anímico, y antipsicóticos en la prevención y/o atenuación de los episodios agudos del trastorno bipolar. Se consideró la efectividad del valproato en términos de los síntomas del estado anímico, la mortalidad, el estado de salud general, el funcionamiento social, los efectos adversos y el grado de aceptación global por parte de los pacientes.

Estrategia de búsqueda

Se utilizó la estrategia de búsqueda del grupo CCDAN. Se hicieron búsquedas en las siguientes bases de datos: El registro de ensayos controlados del Grupo Cochrane de Depresión, Ansiedad y Neurosis (*Cochrane Collaboration Depression, Anxiety and Neurosis Controlled Trials Register* - CCDANCTR), el registro Cochrane de Ensayos Clínicos Controlados (*Cochrane Controlled Clinical Trials Register* - CCCTR), EMBASE, MEDLINE, LILACS, PsycLIT y Psyn dex. Se examinaron las listas de referencias de artículos relevantes y de libros importantes sobre trastornos del estado de ánimo. Se contactó con los autores y con otros expertos en el tema, así como con compañías farmacéuticas para indagar si conocían ensayos publicados o sin publicar que fueran adecuados.

Criterios de selección

Ensayos controlados aleatorios que comparen el uso de valproato contra placebo, otros estabilizadores del estado de ánimo (incluyendo litio y carbamazepina) o neurolepticos con la intención de proporcionar una terapia de mantenimiento para el trastorno bipolar. Los participantes eran hombres y mujeres de todas las edades con un diagnóstico de trastorno bipolar diagnosticado mediante cualquier criterio, y que correspondiera aproximadamente con el código F31 del CIE-10 y con el código

Cochrane



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Página de acceso-comentario

Enviar un comentario sobre esta Revisión Cochrane

Registre sus datos y comentario. Todos los campos son obligatorios

Título de la Revisión Ácido valproico, valproato y divalproex en la terapia de mantenimiento del trastorno bipolar

Nombre *

Email *

Dirección postal *

Ocupación *

Escribir aquí su comentario *

Enviar su comentario

Cancelar



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Página de acceso



VÍNCULOS

[Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus](#)

[Los resúmenes de revisiones Cochrane](#)

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

[Registrar un nombre de usuario](#)

[Suscribirse](#)

[¿Qué es un RSS?](#)

[El canal RSS **XML**](#)



Acceder a la Biblioteca Cochrane Plus

Hacer clic en ACCEDER para iniciar la Biblioteca Cochrane Plus.

ACCEDER

Hacer clic aquí para acceder mediante nombre de usuario y contraseña

Instrucciones:

Si usted ya posee una suscripción o es miembro de una organización que está suscrita, puede acceder a la Biblioteca Cochrane Plus de forma anónima o mediante un nombre y una contraseña.
En caso de problemas con el acceso, contactar con Infoglobal Suport:
Tel: +34 93 - 726 30 44 / +34 93 - 726 81 36
cochrane@infoglobal-suport.com

El canal RSS **XML**

El RSS puede avisarle cada vez que aparece un nueva revisión Cochrane. Hacer clic aquí para saber más

Edición de la Biblioteca Cochrane Plus:

InfoGlobal Suport



Centro Cochrane Iberoamericano



El Centro Cochrane Iberoamericano está ubicado en



HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

El acceso universal gratuito a la BCP, en **todo el territorio español**, es posible gracias a la suscripción realizada por el Ministerio de Sanidad y Consumo.



SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Se puede consultar la BCP de forma gratuita en los siguientes países de bajos ingresos: **Bolivia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana y todos los países caribeños.**

El acceso universal gratuito a la BCP, en **todo el territorio centroamericano**, es posible gracias a la suscripción realizada por la International Health Central American Institute Foundation (IHCAI Foundation).



Los usuarios en el resto de países iberoamericanos (**Argentina, Brasil, Chile, Colombia**



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Página de inicio-número



Búsqueda:

[Restringir la búsqueda](#)

[Anular selección](#) • [Guardar citas](#)

- ☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (2668 de 2668)
- ☐ Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos (2996 de 2996)
-  Bandolera (317 de 317)
-  Informes de Gestión Clínica y Sanitaria (678 de 678)
-  Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (191 de 191)
-  Kovacs (Revisiones del dolor de espalda) (227 de 227)
-  Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria (36 de 36)
- ☐ The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (477942 de 477942)
- ☐ The Cochrane Methodology Register (CMR) (8408 de 8408)
-  About the Cochrane Collaboration (91 de 91)
- ☐ Other Published Reviews (4113 de 4113)
- ☐ Health Technology Assessment Database (HTA) (6011 de 6011)
- ☐ NHS Economic Evaluation Database (NHS EED) (18725 de 18725)

2006 Número 3
ISSN 1745-9990



La Biblioteca Cochrane Plus

la información más fiable y completa sobre los efectos de la atención sanitaria

La Biblioteca Cochrane Plus promueve el trabajo de la Colaboración Cochrane y de otros organismos que reúnen información fiable para guiar las decisiones en la atención sanitaria

[Acerca de La Biblioteca Cochrane Plus](#)

[Utilización de La Biblioteca Cochrane Plus](#)

[Comentarios](#)

[Soporte técnico](#)

[Manual del Revisor](#)

[Noticias](#)

Copyright: Update Software Limited 2006




biblioteca
virtual en salud

Página de inicio-navegar

Barra de navegación



Cochrane





biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Búsqueda libre

The screenshot shows the BVS search interface. At the top, there are navigation buttons: INICIO, DOCUMENTOS, MeSH, HISTORIAL, and AYUDA. Below these is a search bar with the text "diabetes" and a button "Restringir la búsqueda". Below the search bar, it says "diabetes - 12503 documentos encontrados". There are two buttons: "Anular selección" and "Guardar citas". Below these are several search results, each with a checkbox and a description:

- ☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (562 de 2668)
- ☐ Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos (22 de 2996)
- ☒ Bandolera (29 de 317)
- ☒ Informes de Gestión Clínica y Sanitaria (55 de 678)
- ☒ Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (10 de 191)
- ☒ Kovacs (Revisiones del dolor de espalda) (1 de 227)
- ☒ Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria (4 de 36)
- ☐ The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (11122 de 477942)
- ☐ The Cochrane Methodology Register (CMR) (40 de 8408)
- ☒ About the Cochrane Collaboration (27 de 91)
- ☐ Other Published Reviews (129 de 4113)
- ☐ Health Technology Assessment Database (HTA) (97 de 6011)

La búsqueda libre permite buscar por uno o más términos.

Los términos pueden combinarse utilizando los operadores **AND**, **OR**, **NOT**, **NEXT** y **NEAR** y el símbolo del truncamiento *



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Búsqueda libre

Es posible restringir la búsqueda por otros campos, como el año, estado de la revisión o restricción por campos: título, autor, resumen, palabras clave, tipo de documento.

Búsqueda:

[Esconder las opciones](#)

OPCIONES

Período de fechas: 1800 - 2006

Estado: Todos

Restringir la búsqueda a: Sin restricción

Anular

☐ La Base de Sistemática

☐ Registro de (2996 de 2996)

cit

visiones

americanos

Título

Autor

Resumen

Palabras clave

Tipo de documento

Fuente

Bandolera (317 de 317)

Informes de Gestión Clínica y Sanitaria (678 de 678)

Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (191 de 191)

Kovacs (Revisiones del dolor de espalda) (227 de 227)

Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria (36 de 36)

☐ The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (477942 de 477942)

☐ The Cochrane Methodology Register (CMR) (8408 de 8408)

About the Cochrane Collaboration (91 de 91)



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Tesauro MeSH



INCIO DOCUMENTOS MeSH HISTORIAL AYUDA

[Búsqueda de cualificador>>](#) MESH

Buscar un término MeSH:

Tesauro Mostrar el árbol MeSH Explicar

Cualificadores:

Expandir todos los arboles Termina simple

AIDS
see [ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME](#)

AIDS ANTIBODIES
see [HIV ANTIBODIES](#)

AIDS ANTIGENS
see [HIV ANTIGENS](#)

[AIDS ARTERITIS CENTRAL NERVOUS SYSTEM](#)

[AIDS DEMENTIA COMPLEX](#)

AIDS DRUGS
see [ANTI-HIV AGENTS](#)

AIDS ENCEPHALOPATHY
see [AIDS DEMENTIA COMPLEX](#)

AIDS ENTEROPATHY
see [HIV ENTEROPATHY](#)

aids - Microsoft Internet Explorer

aids

An acquired defect of cellular immunity associated with infection by the human immunodeficiency virus (HIV), a CD4-positive T-lymphocyte count under 200 cells/microliter or less than 14% of total lymphocytes, and increased susceptibility to opportunistic infections and malignant neoplasms. Clinical manifestations also include emaciation (wasting) and dementia. These elements reflect criteria for AIDS as defined by the CDC in 1993.

Tree 1

[VIRUS DISEASES \[+19\]](#)

[RNA VIRUS INFECTIONS \[+17\]](#)

[RETROVIRIDAE INFECTIONS \[+7\]](#)

[LENTIVIRUS INFECTIONS \[+6\]](#)

[HIV INFECTIONS \[+10\]](#)

[ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME](#)

[AIDS ARTERITIS CENTRAL NERVOUS SYSTEM](#)

[AIDS-ASSOCIATED NEPHROPATHY](#)

[AIDS DEMENTIA COMPLEX](#)

[AIDS-RELATED COMPLEX](#)



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Tesouro MeSH

INCIO DOCUMENTOS MeSH HISTORIAL AYUDA

[Búsqueda de cualificador>>](#) MESH

Buscar un término MeSH:

ids

Tesouro Mostrar el arbol MeSH Explicar

Cualificadores:

Expandir todos los arboles Terminos simples

AIDS

see [ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME](#)

AIDS ANTIBODIES

see [HIV ANTIBODIES](#)

AIDS ANTIGENS

see [HIV ANTIGENS](#)

[AIDS ARTERITIS CENTRAL NERVOUS SYSTEM](#)

[AIDS DEMENTIA COMPLEX](#)

AIDS DRUGS

see [ANTI-HIV AGENTS](#)

AIDS ENCEPHALOPATHY

see [AIDS DEMENTIA COMPLEX](#)

AIDS ENTEROPATHY

see [HIV ENTEROPATHY](#)

INCIO DOCUMENTOS MeSH HISTORIAL AYUDA

[Búsqueda de cualificador>>](#) MESH

Buscar un término MeSH:

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME

Tesouro Mostrar el arbol MeSH Explicar

Cualificadores:

Expandir todos los arboles Terminos simples

Tree 1

[VIRUS DISEASES \[+19\]](#)

[RNA VIRUS INFECTIONS \[+17\]](#)

[RETROVIRIDAE INFECTIONS \[+7\]](#)

[LENTIVIRUS INFECTIONS \[+6\]](#)

[HIV INFECTIONS \[+10\]](#)

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME *Single term*

[AIDS-ASSOCIATED NEPHROPATHY](#)

[AIDS ARTERITIS CENTRAL NERVOUS SYSTEM](#)

[AIDS DEMENTIA COMPLEX](#)

[AIDS-RELATED COMPLEX](#)

[AIDS-RELATED OPPORTUNISTIC INFECTIONS](#)



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Tesouro MeSH

MESH

Buscar un término MeSH:

VIRUS DISEASES

Tesouro Mostrar el árbol MeSH Explicar

Cualificadores:

Expandir todos los árboles Terminos simple

Tree 1

VIRUS DISEASES [+19] [Explode this tree](#)

[ARBOVIRUS INFECTIONS](#) [+9]

[BRONCHIOLITIS VIRAL](#)

[CENTRAL NERVOUS SYSTEM VIRAL DISEASES](#) [+5]

[DNA VIRUS INFECTIONS](#) [+10]

[ENCEPHALITIS VIRAL](#) [+6]

[EYE INFECTIONS VIRAL](#) [+4]

[FATIGUE SYNDROME CHRONIC](#)

[HEPATITIS VIRAL ANIMAL](#) [+2]

[HEPATITIS VIRAL HUMAN](#) [+5]

Realiza la búsqueda tanto en termino elegido como en todos los términos dependientes

Ha buscado:

VIRUS DISEASES expandir todos los árboles (MeSH)
10715 documentos encontrados en este número de la Biblioteca

Solo realiza la búsqueda por el término de consulta

Ha buscado:

VIRUS DISEASES término simple (MeSH)
158 documentos encontrados en este número



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Búsquedas

Búsqueda:

[Esconder las opciones](#)

OPCIONES

Período de fechas: -

Estado:

Restringir la búsqueda a:

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
término simple (MeSH) - 901 documentos encontrados

[Anular selección](#) • [Guardar citas](#)

- ☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (5 de 2668)
- ☐ Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos (0 de 2996)
- ☐ Bandolera (0 de 317)
- ☐ Informes de Gestión Clínica y Sanitaria (0 de 678)
- ☐ Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (0 de 191)
- ☐ Kovacs (Revisiones del dolor de espalda) (0 de 227)

Pinchamos sobre la Base de Datos
para ver los documentos disponibles



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Cómo visualizar el documento

Búsqueda:

[Esconder las opciones](#)

OPCIONES

Período de fechas: -

Estado:

Restringir la búsqueda a:

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
término simple (MeSH) - 901 documentos encontrados

[Anular selección](#) • [Guardar citas](#)

- ☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (5 de 2668)
 - ☐ Revisiones Completas (5 de 2667)
 - Títulos de los protocolos (0 de 1)
- ☐ Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos (0 de 2996)
- Bandolera (0 de 317)
- Informes de Gestión Clínica y Sanitaria (0 de 678)
- Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (0 de 191)
- Kovacs (Revisiones del dolor de espalda) (0 de 227)
- Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria (0 de 36)

Búsqueda:

[Restringir la búsqueda](#)

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
término simple (MeSH) - 901 documentos encontrados

[Anular selección](#) • [Guardar citas](#)

- ☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (5 de 2668)
 - ☐ Revisiones Completas (5 de 2667)
 - ☐ 1. **Nuevo** Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos.2006
 - ☐ 2. Acetato de megestrol para el tratamiento del síndrome de anorexia-caquexia.2005
 - ☐ 3. Hierbas medicinales para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA.2005
 - ☐ 4. Intervenciones con ejercicios de resistencia progresivos para adultos con VIH/SIDA.2004
 - ☐ 5. Ayuda y educación a los pacientes para promover el cumplimiento de una terapia antiretroviral altamente activa para el VIH/SIDA.2000

Cómo visualizar el documento

OPCIONES

Período de fechas: 1800 - 2006

Estado: Todos

Restringir la búsqueda a: Sin restricción

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
término simple (MeSH) - 901 documentos encontrados

[Anular selección](#) • [Guardar citas](#)

☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (5 de 2668)

☐ Revisiones Completas (5 de 2667)

☐ 1. **Nuevo** Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos.2006

☐ 2. Acetato de megestrol para el tratamiento del síndrome de anorexia-caquexia.2005

☐ 3. Hierbas medicinales para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA.2005

☐ 4. Intervenciones con ejercicios de resistencia progresivos para adultos con VIH/SIDA.2004

☐ 5. Ayuda y educación a los pacientes para promover el cumplimiento de una terapia

ATRÁS ADELANTE ÍNDICE ACERCA DE SALIR

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

¡Nuevo!

[Versión para imprimir](#)

[Visualizar esta revisión en formato PDF](#)

[Enviar un comentario sobre esta revisión](#)

TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN CON ESTAVUDINA, LAMIVUDINA Y NEVIRAPINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH Y SIDA EN ADULTOS

Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW

Fecha de la modificación más reciente: 17 de enero de 2006
Fecha de la modificación significativa más reciente: 22 de febrero de 2006

Esta revisión debería citarse como: Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW. Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos (Revisión Cochrane traducida). En: *La Biblioteca Cochrane Plus*, 2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de *The Cochrane Library*, 2006 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

RESUMEN

Antecedentes

Un régimen favorable para las personas con infección por VIH/SIDA es aquel que proporciona una eficacia óptima, durabilidad de la actividad antirretroviral, tolerabilidad y presenta pocos efectos adversos e interacciones del fármaco. La combinación del inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido nevirapina (NVP) y dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos: estavudina (d4T) y lamivudina (3TC), son ampliamente utilizados como tratamiento de primera línea, especialmente en los países de bajos recursos. Por lo tanto, realizar el análisis de eficacia, durabilidad y tolerabilidad del régimen es importante para los médicos, consumidores y elaboradores de políticas que viven en países ricos y pobres.

INICIO

DOCUMENTOS

MeSH

HISTORIAL

AYUDA

ATRÁS

ADELANTE

ÍNDICE

ACERCA DE

SALIR

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Ocultar el contenido

Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos

Resumen

Resumen en términos sencillos

Antecedentes

Objetivos

Criterios

Estrategia de búsqueda para la identificación de los estudios

Métodos de la revisión

Descripción de los estudios

Calidad metodológica

Resultados

Discusión

Conclusiones de los revisores

Agradecimientos

Potencial conflicto de interés

Notas

Características de los estudios incluidos

Características de los estudios excluidos

Características de los estudios en curso

Tablas adicionales

Referencias

¡Nuevo!

Versión para imprimir

Visualizar esta revisión en formato PDF

Enviar un comentario sobre esta revisión

TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN CON ESTAVUDINA, LAMIVUDINA Y NEVIRAPINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH Y SIDA EN ADULTOS

Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW

Fecha de la modificación más reciente: 17 de enero de 2006

Fecha de la modificación significativa más reciente: 22 de febrero de 2006

Esta revisión debería citarse como: Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW. Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos (Revisión Cochrane traducida). En: *La Biblioteca Cochrane Plus*, 2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de *The Cochrane Library*, 2006 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

RESUMEN

Antecedentes

Un régimen favorable para las personas con infección por VIH/SIDA es aquel que proporciona una eficacia óptima, durabilidad de la actividad antirretroviral, tolerabilidad y presenta pocos efectos adversos e interacciones del fármaco. La combinación del inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido nevirapina (NVP) y dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos: estavudina (d4T) y lamivudina (3TC), son ampliamente utilizados como tratamiento de primera línea, especialmente en los países de bajos recursos. Por lo tanto, realizar el análisis de eficacia, durabilidad y tolerabilidad del régimen es importante para los médicos, consumidores y elaboradores de políticas que viven en países ricos y pobres.



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Cómo guardar e imprimir

INCIO

DOCUMENTOS

MeSH

HISTORIAL

AYUDA

ATRÁS

ADELANTE

INDICE

ACERCA DE

SALIR

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Búsqueda:

Esconder las opciones

OPCIONES

Período de fechas: 1800 - 2006

Estado: Todos

Restringir la búsqueda a: Sin restricción

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME

término simple (MeSH) - 901 documentos encontrados

Anular selección

Guardar citas

☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (5 de 2668)

☐ Revisiones Completas (5 de 2667)

☐ 1. **Nuevo** Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos.2006

☐ 2. Acetato de megestrol para el tratamiento del síndrome de anorexia-caquexia.2005

☐ 3. Hierbas medicinales para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA.2005

☐ 4. Intervenciones con ejercicios de resistencia progresivos para adultos con VIH/SIDA.2004

¡Nuevo!

Versión para imprimir

Visualizar esta revisión en formato PDF

Enviar un comentario sobre esta revisión

TRATAMIENTO DE COMBINACIÓN CON ESTAVUDINA, LAMIVUDINA Y NEVIRAPINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH Y SIDA EN ADULTOS

Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW

Fecha de la modificación más reciente: 17 de enero de 2006

Fecha de la modificación significativa más reciente: 22 de febrero de 2006

Esta revisión debería citarse como: Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW. Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos (Revisión Cochrane traducida). En: *La Biblioteca Cochrane Plus*, 2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: <http://www.update-software.com>. (Traducida de *The Cochrane Library*, 2006 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.).

RESUMEN

Antecedentes

Un régimen favorable para las personas con infección por VIH/SIDA es aquel que proporciona una eficacia óptima, durabilidad de la actividad antirretroviral, tolerabilidad y presenta pocos efectos adversos e interacciones del fármaco. La combinación del inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido nevirapina (NVP) y dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos: estavudina (d4T) y lamivudina (3TC), son ampliamente utilizados como tratamiento de primera línea, especialmente en los países de bajos recursos. Por lo tanto, realizar el análisis de eficacia, durabilidad y tolerabilidad del régimen es importante para los médicos, consumidores y elaboradores de políticas que viven en países ricos y pobres.



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Cómo guardar e imprimir

INCIO DOCUMENTOS MeSH HISTORIAL AYUDA

Esconder las opciones

OPCIONES

Período de fechas: 1800 - 2006

Estado: Todos

Restringir la búsqueda a: Sin restricción

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME
término simple (MeSH) - 901 documentos encontrados

Anular selección • **Guardar citas**

☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (5 de 2668)

☐ Revisiones Completas (5 de 2667)

☒ 1. **Nuevo** Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos.2006

☒ 2. Acetato de megestrol para el tratamiento del síndrome de anorexia-caquexia.2005

☐ 3. Hierbas medicinales para el tratamiento de la infección por VIH y SIDA.2005

☐ 4. Intervenciones con ejercicios de resistencia progresivos para adultos con VIH/SIDA 2004

http://212.188.234.56/newgenClibPlus/ASP/SelectDBToExport.as...

Cerrar la ventana

Descargar los documentos seleccionados

Tipo de documento

- Revisiones completas (2 records / 2K) [Descargar](#)
- Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos (0) -
- CENTRAL(0) -
- The Cochrane Methodology Register (CMR)(0) -

CDSR_Revisiones.txt - Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ayuda

Record #1 of 2
ID:CD004535-ES
TI:Tratamiento de combinación con estavudina, lamivudina y nevirapina
AU:Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW
SO:Siegfried NL, Van Deventer PJU, Mahomed FA, Rutherford GW. Tra
el tratamiento de la infección por VIH y SIDA en adultos (Revisión Cochr
Oxford: Update Software Ltd. Disponible a: http://www.update-software.c
John Wiley & Sons, Ltd.).

Record #2 of 2
ID:CD004310-ES
TI:Acetato de megestrol para el tratamiento del síndrome de anorexia-ca
AU:Berenstein EG, Ortiz Z
SO:Berenstein EG, Ortiz Z. Acetato de megestrol para el tratamiento de
Biblioteca Cochrane Plus, 2006 Número 3. Oxford: Update Software Ltd
Cochrane Library, 2006 Issue 3. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Consulta de descriptores

ATRÁS ADELANTE ÍNDICE ACERCA DE SALIR

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
DIRECCIÓN GENERAL DE LA AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Código del grupo editorial HM-HIV

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Recursos externos

- No sources of support supplied

Recursos internos

- South African Cochrane Centre, Medical Research Council SOUTH AFRICA
- Cochrane HIV/ AIDS Mentoring Programme SOUTH AFRICA
- University of Stellenbosch SOUTH AFRICA
- United Kingdom Cochrane Centre UK

Palabras clave

Medical Subject Headings (MeSH)
[Acquired Immunodeficiency Syndrome](#) [drug therapy]; [Adult](#); [Anti-HIV Agents](#) [therapeutic use]; [Drug Therapy, Combination](#); [HIV Infections](#) [drug therapy]; [HIV-1](#); [Lamivudine](#) [administration & dosage]; [Nevirapine](#) [administration & dosage]; [Randomized Controlled Trials](#); [Reverse Transcriptase Inhibitors](#) [therapeutic use]; [Stavudine](#) [administration & dosage]
Mesh check words: [Female](#) [Humans](#) [Male](#)

Búsqueda:

[Esconder las opciones](#)

OPCIONES

Período de fechas: 1800 - 2006

Estado: Todos

Restringir la búsqueda a: Sin restricción

**ANTI-HIV AGENTS expandir todos los árboles (MeSH)
- 1068 documentos encontrados**

Anular selección • **Guardar citas**

- ☐ La Base de Datos Cochrane de Revisiones Sistemáticas (6 de 2668)
- ☐ Registro de Ensayos Clínicos Iberoamericanos (0 de 2996)
- ☒ Bandolera (0 de 317)
- ☒ Informes de Gestión Clínica y Sanitaria (0 de 678)
- ☒ Agencias Iberoamericanas de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (0 de 191)
- ☒ Kovacs (Revisiones del dolor de espalda) (0 de 227)



biblioteca
virtual en salud

Cochrane

Documentos sin texto completo

227)

Evidencia. Actualización en la práctica ambulatoria (0 de 36)

☐ The Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (1051 de 477942)

documentos 1 a 20 de 1051

☐ 1. **Nuevo** Acute and chronic chorioamnionitis and the risk of perinatal human immunodeficiency virus-1 transmission.2006

☐ 2. **Nuevo** Effect of extended exposure to grapefruit juice on cytochrome P450 3A activity in humans: comparison with ritonavir.2006

☐ 3. **Nuevo** Hepatic steatosis in HIV-HCV coinfectd patients: analysis of risk factors.2006

☐ 4. **Nuevo** Increased antiretroviral potency by the addition of enfuvirtide to a four-drug regimen in antiretroviral-naive, HIV-infected patients.2006

☐ 5. **Nuevo** An open-label, randomized comparative pilot study of a single-class quadruple therapy regimen versus a 2-class triple therapy regimen for individuals initiating antiretroviral therapy.2006

☐ 6. **Nuevo** A randomized crossover study to determine bioequivalence of generic and brand name nevirapine, zidovudine, and

acute chorioamnionitis and labor length ($r = 0.208$; $P = .002$), time of ruptured membrane ($r = 0.177$; $P = .008$), and cord IL-6 ($r = 0.390$; $P < .001$). Chronic chorioamnionitis was associated with high viral load ($P = .05$) and low cord IL-6 ($P < .001$). Severe chronic chorioamnionitis was associated with intrauterine HIV-1 transmission (odds ratio [OR] = 7.61; 95% CI = 1.04-85.5), but no correlation was demonstrated between acute chorioamnionitis and vertical transmission. CONCLUSION: In a setting of high perinatal nevirapine use, acute chorioamnionitis was not associated with vertical HIV-1 transmission. Risk for intrauterine transmission increased significantly when chronic chorioamnionitis was present.

Medical Subject Headings (MeSH) [Acute Disease](#); [Anti-HIV Agents](#) [therapeutic use]; [*Chorioamnionitis](#) [epidemiology]; [Chronic Disease](#); [*Disease Transmission, Vertical](#) [prevention & control]; [Fetal Blood](#); [*HIV-1](#); [HIV Infections](#) [blood]; [HIV Infections](#) [drug therapy]; [*HIV Infections](#) [epidemiology]; [*HIV Infections](#) [transmission]; [Interleukin-6](#) [blood]; [Labor, Obstetric](#); [Maternal-Fetal Exchange](#); [Nevirapine](#) [therapeutic use]; [Predictive Value of Tests](#); [Prevalence](#); [Research Support, N.I.H., Extramural](#); [Research Support, Non-U.S. Gov't](#); [Risk Assessment](#); [Time Factors](#)

Mesh check words: [Adult](#) • [Female](#) • [Humans](#) • [Pregnancy](#)

Correspondence address School of Medicine, University of Alabama, Birmingham, AL 35294-0024, USA. bchi@uab.edu

Accession Number PUBMED 16389028

Publication type Controlled Clinical Trial; Journal Article

ID CN-00553951

Available Links [PubMed](#)

Historial

Desde el Historial
podemos reutilizar las
búsquedas realizadas o
combinar varias

HISTORIAL

Búsqueda: 

[Restringir la búsqueda](#)

[Borrar](#)

#1.	ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME término simple (MeSH)	901
#2.	diabetes	12503

Edite # - Microsoft Internet Explorer

Edite #1

Edite la búsqueda y pues haga clic en Ejecutar para volver a ejecutarla o Borrar para borrarla

☐ Búsqueda regular ☒ Búsqueda MeSH ☐ Búsqueda de calificadores:

Búsqueda:

Período de fechas: -

Estado:

[Ejecutar](#) [Borrar](#) [Cancelar](#)

HISTORIAL

Búsqueda: 

[Esconder las opciones](#)

OPCIONES

Período de fechas: -


Estado:

Restringir la búsqueda a:

[Borrar](#)

#1.	ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME término simple (MeSH)	901
#2.	diabetes	12503
#3.	(#1 and #2) (2005 hasta la fecha actual)	1

Internet Visible e Invisible




Muchas Gracias

silviahernandez@isciii.es

Internet Visible e Invisible



Prácticas



BÚSQUEDA LIBRE:

1º.- Búsqueda libre por **hepatitis**.

2º.- Búsqueda libre combinando dos términos

3º.- Redefinir la búsqueda anterior limitándola a los años 2005-2007.

BÚSQUEDA LIBRE Vs. DESCRIPTORES

4º.- Buscar el término **cirrosis** tanto en la **búsqueda libre** y como utilizando el Mesh

BÚSQUEDA POR DESCRIPTORES:

"término simple" o "expandir todos los árboles"

5º.- Buscar documentos que traten sobre el **personal de enfermería** utilizando el tesoro MeSH e identificar sus términos específicos.

6º.- Localizar documentos sobre la **organización del personal de enfermería**.

7º.- Realizar una búsqueda de documentos sobre el diagnóstico de la **Hepatitis C** utilizando el tesoro MeSH.

USO DEL HISTORIAL

8º.- Refinar la **búsqueda anterior** a los dos últimos años, es decir, **2005-2007**.

9º.- Vamos a realizar un ejemplo de una búsqueda donde necesitamos emplear una **palabra reservada**.